VOLET INTERNE RECTO (

FRUITS, HORTICULTURE ET HERBES

Les combinaisons suivantes de cultures et de produits sont sélectives:
- en pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers et griottiers et fraisiers en mélange avec ENVIDOR® (9404/B).

D'autres combinaisons avec un fongicide ou insecticide peuvent être appliquées sous la responsabilité de l'utilisateur.

Kiwi de Sibérie, fenouil (plein air et sous protection) et oignons de printemps (plein air et sous protection)

Volume d'eau
TREND® 90 peut être appliqué avec un volume d'eau de 150-400 litre à l'hectare.

Dose et usages
100 ml par 100 L de bouillie.

Pommiers, poiriers, cerisiers et griottiers, pruniers, fraisiers (plein air et sous protection), groseilliers (blanc, rouges, cassis), groseilliers à maquereau, myrtilles, airelles, ronces (mûres) et framboisiers.
Maïs doux (plein air). laitues (plein air), jeunes pousses (recoltées jusqu'au stade 8 vraies feuilles), endives, radicchio rosso, pain de sucre, cresson alénois, haricot, fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse) (plein air), pois secs récoltés écossés (plein air),pois vert récolté avec et sans les gousses (plein air), pois (plein air), choux pommés (plein air), chou rouge (plein air), chou de Savoie (chou de Milan) (plein air), chou cabus (coeur de boeuf) (plein air), chou blanc (plein air), chou de Bruxelles (plein air), chou-fleur (blanc et vert) (plein air et sous protection), chou brocoli (plein air), Chou chinois, pakchoï et pakchoï en rosette (plein air et sous protection), chou frisé (plein air), chou rave (plein air), radis, radis noir et radis rave, carottes (plein air), panais, navet, chou-navet, rutabaga, céleri-raves (plein air), scorsonère, raifort, oignons(récoltés secs)(plein air), échalote, ail, céleri à côtes, poireau (plein air), fenouil (plein air et sous protection), oignons de printemps (plein air et sous protection) et persil à grossess racine (consommation de la racine) (plein air)
Plantes aromatiques et medicinales (PAM) (plein air)

Volume d'eau
TREND® 90 peut être appliqué avec un volume d'eau de 150-1000 litre à l'hectare.

Dose et usages
100 ml par 100 L de bouillie pour un volume d'eau allant jusque 400 L/ha.
Pour des volumes d'eau supérieurs à 400 L/ha, la dose est de 50 ml par 100 L de bouillie.

Le délai avant récolte est en fonction du produit auquel l'adjuvant est ajouté.

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations.
Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans le programme de désherbage à basses doses. La diminuation de la dose, appliquée n'autorise pas d'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la reduction du délai avant récolte.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE DE PULVÉRISATION
On ajoutera le TREND® 90 à la bouille phytosanitaire dès que la cuve est remplis d'eau au ¾.

DESTRUCTION EMBALLAGE VIDE
Vider complètement l'emballage et rincer à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation et utilisées suivant les prescriptions d'emploi.
L'emballage ainsi rincé ne peut être utilisé à d'autres fins mais doit être traité conformément aux dispositions légales régionales (Phytofar Recover).

IMPORTANT
Le vendeur garantit que ce produit est conforme à la description chimique indiquée sur cette étiquette et qu'il est destiné aux applications reprises sur l'étiquette et seulement lorsqu'il est utilisé en accord avec les recommandations d'emploi dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie ne s'étend pas à l'usage de ce produit pour des applications non recommandées ou contraires aux indications d'emploi, ou dans des conditions anormales d'utilisation ou sous des conditions qui ne peuvent pas raisonnablement être prévues par le vendeur ; l'acheteur assume tous les risques de tels usages. Le vendeur ne fournit aucune autre garantie, ni expresse, ni impliquée.

TREND® 90, TITUS®, SAFARI® et ACCENT® Marques déposées de DuPont
ENVIDOR® : Marque déposée de Bayer Crop Science

TOEGESTAAN GEBRUIK

Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als uitvloeier in de teelt van:

a. aardappelen (open lucht);
b. aardappelpootgoedteelt;
c. maïs (behalve suikermaïs);
d. suikermaïs (open lucht);
e. mergkool (open lucht) en voederkool (open lucht);
f. witloofwortelteelt (open lucht);
g. cichorei;
h. appelbomen;
i. perenbomen;
j. kersen- en kriekenbomen;
k. pruimenbomen;
l. aardbeien (open lucht en onder bescherming);
m. aalbessen (witte, rode, zwarte);
n. stekelbes (kruisbes);
o. blauwe bosbessen;
p. rode bosbessen / veenbessen;
q. braamstruiken;
r. frambozenstruiken;
s. slasoorten (open lucht);
t. babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) ;
u. andijvie, radicchio rosso, suikerbrood;
v. tuinkers;
w. stamslabonen (prinsesse-, snijboon) (groengeoogst);
x. vicia-bonen (groengeoogst, zonder peul) (open lucht);
y. erwten (drooggeoogst zonder peul, groengeoogst met en zonder peul en voedererwten)(open lucht);
z. sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht);
aa. spruitkool (open lucht);
bb. bloemkool (witte en groene) (open lucht en onder bescherming);
cc. broccoli (open lucht);
dd. Chinese kool, paksoi en tatsoi (open lucht en onder bescherming);
ee. boerenkool (krulkool) (open lucht);
ff. koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht);
gg. radijs;
hh. rammenas en rettich;
ii. wortelen (open lucht);
jj. pastinaak;
kk. raap (stoppelraap, meiraap);
ll. koolraap;
mm. knolselder (open lucht);
nn. schorseneren;
oo. mierikswortel;
pp. uien (drooggeoogste)(open lucht);
qq. sjalot;
rr. knoflook;
ss. selderij (bleek, groene en witte);
tt. prei (open lucht);
uu. aromatische en medicinale kruiden (AMK) (open lucht);
vv. knolvenkel (open lucht en onder bescherming);
ww. bosuien (lente-ui) (open lucht en onder bescherming);
xx. wortelpeterselie (consumptie wortels) (open lucht);
yy. kiwibes (open lucht en onder bescherming).

GEBRUIKSAANWIJZING

ALGEMEEN

Werking

TREND® 90 verbetert de aanhechting en de verdeling van de spuitvloeistof op de behandelde planten. Vandaar dat TREND® 90 aan de spuitoplossing wordt toegevoegd wanneer de te behandelen planten moeilijk te bevochtigen zijn door hun waslaag of beharing. Dit kan, zij het niet in alle gevallen, de werkzaamheid van het product waaraan TREND® 90 wordt toegevoegd verbeteren.

Toevoegen van TREND® 90 aan oplossingen van spuitpoeders verhindert de vorming van zichtbare spuitresten.

TOEPASSINGEN

AKKERBOUW GEWASSEN

De volgende combinaties van gewassen en middelen zijn veilig gebleken:
- in maïs en aardappelen in menging met TITUS® (8334/B).
- in maïs in menging met ACCENT® (9626/B).
- in cichorei en witloof in menging met SAFARI® (8475/B).

Overige combinaties met een erkend fungicide of insecticide kunnen worden toegepast onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Aardappelen (open lucht), aardaardappelpootgoedteelt, maïs (behalve suikermais), witloofwortelteelt (open lucht) en cichorei

Waterhoeveelheid

TREND® 90 kan gebruikt worden in een volume van 150-400 l water per ha.

Dosis en gebruik

100 ml per 100 L spuitoplossing.

Mergkool (open lucht) en voederkool (open lucht)

Waterhoeveelheid

TREND® 90 kan gebruikt worden in een volume van 150-1000 L water per ha.

Dosis en gebruik

100 ml per 100 L spuitoplossing tot een watervolume van 400 L/ha.

Voor een watervolume boven de 400 L/ha is de dosis 50 ml per 100 L spuitvloeistof.

FRUITGEWASSEN, GROENTE- EN KRUIDENTEELT

De volgende combinaties van gewas en middel zijn veilig gebleken:
- in appel, peer, pruim, kers en aardbei in menging met ENVIDOR® (9404/B)

FACE CACHÉE RECTO (SIDE 2)

Overige combinaties met een erkend fungicide of insecticide kunnen worden toegepast onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Kiwibes, knolvenkel (open lucht en onder bescherming) en bosuien (lente-ui) (open lucht en onder bescherming)

Waterhoeveelheid
TREND® 90 kan gebruikt worden in een volume van 150-400 l water per ha.

Dosis en gebruik
100 ml per 100 L spuitoplossing.

Appelbomen, perenbomen, kersen- en kriekenbomen, pruimenbomen, aardbeien (open lucht en onder bescherming), aalbes (witte, rode, zwarte), stekelbes (kruisbes), blauwe bosbessen, rode bosbessen, braamstruiken en frambozenstruiken
Suikermaís (open lucht), slasoorten (open lucht), babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren), andijvie, radicchio rosso, suikerbrood, tuinkers, stamslabonen (prinsesse-, snijboon) (groengeoogst), vicia-bonen (groengeoogst, zonder peul) (open lucht), drooggeoogste erwten zonder peul (open lucht), groengeoogste erwten met en zonder peul (open lucht), voedererwten (open lucht) sluitkool (kabuiskool) (open lucht), spruitkool (open lucht), witte kool (open lucht), rode kool (open lucht), savooiekool (open lucht), spitskool (open lucht), bloemkool (witte en groene) (open lucht en onder bescherming), broccoli (open lucht), Chinese kool, paksoi en tatsoi (open lucht en onder bescherming), boerenkool (krulkool) (open lucht), koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht), radijs, rammenas en rettich, wortelen (open lucht), pastinaak, raap (stoppelraap, meiraap), koolraap, knolselder (open lucht), schorseneren, mierikswortel, uien(drooggeoogst)(open lucht), sjalot, knoflook, bleekselderij, prei (open lucht) en wortelpeterselie (consumptie wortels) (open lucht)
Aromatische en medicinale kruiden (AMK) (open lucht)

Waterhoeveelheid
TREND® 90 kan gebruikt worden in een volume van 150-1000 L water per ha.

Dosis en gebruik
100 ml per 100 L spuitoplossing tot een watervolume van 400 L/ha.
Voor een watervolume boven de 400 L/ha is de dosis 50 ml per 100 L spuitvloeistof.

De veiligheidstermijn is in functie van het bestrijdingsmiddel waarmee het product gemengd wordt.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

VOORBEREIDING VAN DE SPUITVLOEISTOF
Voeg TREND® 90 toe aan de spuitoplossing zodra de tank met roerinrichting voor ¾ met water is gevuld.

VERNIETIGEN VAN DE LEGE VERPAKKING
De verpakking volledig ledigen en met water spoelen door middel van een manueel systeem (drie opeenvolgende malen schudden) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden en verspoten volgens de gebruiksaanwijzing.
De aldus gespoelde verpakking mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden, maar moet volgens de wettelijke regionale voorschriften afgevoerd worden (Phytofar Recover).

BELANGRIJK
Verkoper garandeert, dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Verkoper kan alleen garanderen, dat het product redelijk geschikt is voor de doeleinden op het etiket vermeld, waar het onder normale omstandigheden wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie vervalt bij gebruik van dit product in afwijking van de aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale omstandigheden of bij gebruik onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet door verkoper konden worden voorzien; in zulke gevallen draagt de koper het volledig risico. Enige andere garantie of aansprakelijkheid wordt door verkoper niet verstrekt noch aanvaard en mag ook niet uit het bovenstaande worden afgeleid.

TREND® 90, TITUS®, SAFARI® en ACCENT® Gedeponeerd handelsmerk van DuPont
ENVIDOR® Gedeponeerd handelsmerk van Bayer Crop Science

(SIDE 3)

FACE PRINCIPALE REC

Du Pont de Nemours (Belgium) B.V.B.A.
Antoon Spinoystraat 6
2800 Mechelen
Tel.: 0032 475/415.415

Fabriqué dans la Communauté Européenne
Gefabriceerd in de Europese Unie

® Marque déposée/Gedeponeerd handelsmerk van Du Pont

3 576960 015639

K-32988 / 31412 - BELGIUM-LUXEMBOURG

Numéro de lot / Date de production : voir haut de l'emballage
Lotnummer / Productiedatum: zie bovenzijde van fles

Trend® 90

MOUILLANT / UITVLOEIER

TO (SIDE 4)

Contenu / Inhoud:

1 L ℮

(SIDE 5)

Numéro d'agréation/Erkenningsnummer: 9002P/B (Belgique / België)
Numéro d'agréation: L 1550-51 (Luxembourg)

Mouillant pour usage déterminé en agriculture, fruits, horticulture et herbes.

Concentré soluble (SL) à base de 900 g/l isodecyl alcool ethoxyle.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

- Avant l'utilisation, lire attentivement le mode d'emploi.
- Pour les dispositions à prendre en cas d'empoisonnement ou d'autre incident: voir emballage.

Dans les situations urgentes vous pouvez toujours prendre contact avec le centre DUCHEM HELP: **tel. 00.352/3666.6543** ou avec le Centre Anti-Poisons, **tel. 070/245.245.**

Uitvloeier in bepaalde akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groente- en kruidenteelt.

Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 900 g/l isodecyl-alcohol ethoxylaat.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

- Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.
- Voor richtlijnen in geval van vergiftiging of van andere ongevallen: zie verpakking.

In noodgevallen kunt u contact opnemen met het DUCHEM HELP centrum:
tel. 00.31.78/630.1899 of met het Antigifcentrum: **tel. 070/245.245.**

STOCKAGE : Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé.

OPSLAG: In originele goed gesloten verpakking bewaren.

PhytofarRecover

www.phytofarrecover.eu

VOLET PRINCIPAL RECTO (SIDE 6)

MENTIONS DE DANGER

- Nocif en cas d'ingestion.
- Provoque des lésions oculaires graves.

GEVARENAANDUIDINGEN

- Schadelijk bij inslikken.
- Veroorzaakt ernstig oogletsel.

GEFAHRENHINWEISE

- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Verursacht schwere Augenschäden.

CONSEILS DE PRUDENCE

- Tenir hors de portée des enfants.
- Se laver les mains et le visage soigneusement après manipulation.
- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
- Éliminer le contenu / récipient dans une usine d'incinération agréée.





Danger
Gevaar
Gefahr

AUTRES MENTIONS

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Na het werken met dit product handen en gezicht grondig wassen.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- Voorkom lozing in het milieu.
- Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
- Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

ANDERE VERMELDINGEN

- Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

VORSICHTSMAßNAHMEN

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach Gebrauch Hände un Gesicht gründlich waschen.
- Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
- Inhalt / Behälter in einer zugelassenen Verbrennungsanlage zuführen.

MODE D'EMPLOI À L'INTÉRIEUR, OUVRIR ICI
GEBRUIKSAANWIJZING IS INGESLOTEN

P. 186 🟥 P. 429 ⬜ P. 151 🟧 NOIR ⬛

VOLET PRINCIPAL VERSO (

CARACTERISTIQUES

Matières actives: alcool isodecylique ethoxyle 900 g/l
Familles chimiques: alcool ethoxyles
Nature de la préparation: concentré soluble (SL)

Etiquette: GHS05 + GHS07, Mot de signal : Danger. H302, H318

Risques principaux lors d'une intoxication: nocif en cas d'ingestion et risque de lésions oculaires graves.

PREMIERS SOINS LORS D'ACCIDENTS

Après **inhalation**:
Eloigner la victime de l'endroit contaminé et l'amener à l'air frais.
Si des symptômes apparaissent, consultez un médecin.

Après **ingestion**:
Rincer immédiatement la bouche avec 1 à 2 verres d'eau. Ensuite faire vomir en stimulant le fond de la gorge avec le doigt ou un objet (par ex. petite cuillère). Ne jamais rien donner par la bouche à des personnes inconscientes et ne pas les laisser vomir. Ne pas avaler des produits favorisant la résorption, comme p.ex. des graisses, du lait ou de l'alcool.
Une solution de charbon de bois actif dans de l'eau est conseillée.
Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée.

Après **contact avec la peau**:
Rincer abondamment la peau avec de l'eau et du savon ou prendre une douche pendant 15 minutes. Eliminer entretemps les vêtements et chaussures souillées.
Si des symptômes apparaissent, consultez un médecin.

En cas de **contact avec les YEUX**:
Rincer immédiatement les yeux pendant 10 minutes avec beaucoup d'eau courante. Rincer tout en évitant de toucher l'œil non atteint. En cas de lentilles de contact: enlever les lentilles et ensuite rincer.
Consulter immédiatement un ophtalmologue.

CONSEILS POUR LE MEDECIN

- **Préhospitalisation**: traitement des symptômes
- Le traitement suivant est symptômatique. Etant donné que jusqu'à présent nous avons uniquement des données issues d'expérimentations sur animaux et qu'aucun ou très peu de cas ont été rapportés chez l'homme, une **observation à l'hôpital est conseillée.**
  Contacter le Centre Antipoisons pour plus d'informations.

Pour des informations complémentaires,
contacter le **Centre Antipoisons** : **070/245 245**

Vous pouvez aussi prendre contact avec le centre DUCHEM HELP au Luxembourg, numéro **00.352/3666.6543** pour les francophones.

Transmettez-nous vos symptômes;
vous aidez de cette manière d'autres utilisateurs.

SIDE 8)

EIGENSCHAPPEN

Werkzame stof(fen): isodecyl-alcohol ethoxylaat 900 g/l
Chemische familie(s): alcohol ethoxylaten
Aard van het preparaat: met water mengbaar concentraat (SL)

Etikettering: GHS05 + GHS07, Signaalwoord: Gevaar H302, H318

Belangrijkste symptomen bij intoxicatie: schadelijk bij opname door de mond en gevaar voor ernstig oogletsel.

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

Na **inademen**: Het slachtoffer uit de besmette omgeving verwijderen en in de frisse lucht brengen.
Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts.

Na **inslikken**: Spoel onmiddelijk de mond, met 1-2 glazen water. Vervolgens laten braken door het diepste van de keel met vinger of object (bijv. lepeltje) te prikkelen. Bewusteloze mensen niets via de mond toedienen en niet laten braken. Geen resorptiebevorderende middelen als vetten, melk of alcohol innemen. Een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen.
Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen.

Na **huidcontact**: Spoel de huid overvloedig met water en zeep of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen.

Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts.

VOLET INTERNE VERSO (

Na **oogcontact**: Spoel overvloedig met zacht stromend water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna.
Raadpleeg onmiddellijk een oogarts.

AANWIJZINGEN VOOR DE GENEESHEER

- **Prehospitaal**: symptomatische behandeling.
- De verdere behandeling blijft symptomatisch. Daar er tot op heden enkel gegevens uit dierenexperimenten voorhanden zijn en geen of zeer weinig gevallen gerapporteerd zijn bij de mens, wordt een **observatie in het ziekenhuis aangeraden**. Contacteer het Antigifcentrum voor meer informatie.

Voor bijkomende inlichtingen,
contacteer **Het Antigifcentrum 070/245 245**

U kunt ook contact opnemen met het DUCHEM HELP centrum in Dordrecht, telefoonnummer **00.31.78/630.1899** voor nederlandstaligen

Meld ons uw ziekteverschijnselen;
u helpt hiermee andere gebruikers.

UTILISATION AUTORISEE

Prescription d'emploi

Est uniquement autorisé pour l'emploi en tant que mouillant dans la culture de:

a. pommes de terre (plein air);
b. culture de plants de pommes de terre;
c. maïs (sauf maïs doux);
d. maïs doux (plein air);
e. chou moëllier (plein air) et chou fourrager (plein air);
f. culture de racines de witloof (plein air);
g. chicorée;
h. pommiers;
i. poiriers;
j. cerisiers et griottiers;
k. pruniers;
l. fraisiers (plein air et sous protection);
m. groseilliers (blancs, rouges, cassis);
n. groseilliers à maquereau;
o. myrtilles;
p. airelles;
q. ronces (mûres);
r. framboisiers;
s. laitues (plein air);
t. jeunes pousses (recoltées jusqu'au stade 8 vraies feuilles) ;
u. endives, radicchio rosso, pain de sucre;
v. cresson alénois;
w. haricot;
x. fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse) (plein air);
y. pois (sec récolté écossés, vert récolté avec et sans les gousses et les pois) (plein air);
z. choux pommés (chou cabus, chou blanc, chou rouge, chou pointu, chou de milan)(plein air);
aa. chou de Bruxelles (plein air);
bb. chou-fleur (blanc et vert) (plein air et sous protection);
cc. chou brocoli (plein air);
dd. Chou chinois, pakchoï et pakchoï en rosette (plein air et sous protection);
ee. chou frisé (plein air);
ff. chou rave (plein air);
gg. radis;
hh. radis noir et radis rave;
ii. carottes (plein air);
jj. panais;
kk. navet;
ll. chou-navet, rutabaga;
mm. céleri-raves (plein air);
nn. scorsonère;
oo. raifort;
pp. oignons (récoltés secs)(plein air);
qq. échalote;
rr. ail;
ss. céleri (à côtes, blance et vert);
tt. poireau (plein air);
uu. plantes aromatiques et medicinales (PAM) (plein air);
vv. fenouil (plein air et sous protection);
ww. oignons de printemps (plein air et sous protection);
xx. persil à grosse racine (consommation de la racine) (plein air);
yy. kiwi de Sibérie (plein air et sous protection).

SIDE 9)

MODE D'EMPLOI

GÉNÉRALITÉS

Mode d'action
TREND® 90 améliore l'adhésivité et la répartition de la bouillie sur les plantes traitées. L'adjonction de TREND® 90 aux bouillies phytosanitaires est indiquée pour améliorer l'adhésivité de la bouillie sur les plantes difficiles à mouiller à cause de la cuticule cireuse ou de la pilosité. Cela peut, dans la plupart des cas, améliorer l'action du produit auquel le TREND® 90 est ajouté.
L'adjonction de TREND® 90 aux bouillies phytosanitaires contenant des poudres mouillables, permet également d'éviter les dépôts visibles.

APPLICATIONS

AGRICULTURE

Les combinaisons suivantes de cultures et de produits sont sélectives:
- en maïs et pommes-de-terre en mélange avec TITUS® (8334/B).
- en maïs en mélange avec ACCENT® (9626/B).
- en chicorée et cultures de racines de witloof en mélange avec SAFARI® (8475/B)

D'autres combinaisons avec un fongicide ou insecticide peuvent être appliquées sous la responsabilité de l'utilisateur:

Pommes de terre (plein air), culture de plants de pomme de terre, maïs (sauf maïs doux), culture de racines de witloof et chicorée

Volume d'eau
TREND® 90 peut être appliqué avec un volume d'eau de 150-400 litre à l'hectare.

Dose et usages
100 ml par 100 L de bouillie.

Chou moëllier (plein air) et chou fourrager (plein air)

Volume d'eau
TREND® 90 peut être appliqué avec un volume d'eau de 150-1000 litre à l'hectare.

Dose et usages
100 ml par 100 L de bouillie pour un volume d'eau allant jusque 400 L/ha.
Pour des volumes d'eau supérieurs à 400 L/ha, la dose est de 50 ml cc par 100 L de bouillie.

NOIR